



Je prends **soin** de moi,  
de ma famille, je me **protège**  
avec la **PrEP**



**1.**

**LA PrEP  
C'EST  
QUOI ?**



# UN TRAITEMENT CONTRE LE VIH

**La PrEP me protège du VIH mais pas des infections sexuellement transmissibles.**

**La PrEP protège les personnes qui ne sont pas infectées par le VIH.**

**La PrEP n'empêche pas de tomber enceinte.**



**2.**

**LA PrEP  
C'EST POUR  
QUI ?**

# POUR TOUT LE MONDE

**Tout le monde** peut bénéficier de la PrEP selon sa situation et après en avoir discuté avec le docteur.

JE N'AI PAS D'A.M.E  
OU D'ASSURANCE  
MALADIE



✓ c'est OK

JE N'AI PAS  
DE PAPIERS



✓ c'est OK

JE N'AI PAS  
D'ARGENT



✓ c'est OK





**3.**

**COMMENT  
PRENDRE  
LA PrEP ?**



# JE PEUX ME FAIRE PRESCRIRE LA PREP



CHEZ MON DOCTEUR



À L'HÔPITAL



DANS UN CENTRE  
DE DÉPISTAGE OU  
CENTRE DE SANTÉ



# MA PREMIÈRE CONSULTATION



MAIS COMMENT  
ÇA MARCHE ?

Le **docteur** m'explique ce qu'est **la PrEP**, les **examens à faire** et si ce traitement est **fait pour moi**.







Je peux **récupérer le traitement**  
à la **pharmacie**.

# ON LA PREND TOUS LES JOURS



C'est **facile**, je la prends **tous les jours à heure fixe** et pendant le repas si possible.



## UN RENDEZ-VOUS TOUS LES 3 MOIS



**1 rendez-vous** avec mon médecin **tous les 3 mois**  
pour faire un **bilan de santé** et **renouveler ma PrEP.**



**4.**

**POURQUOI  
PRENDRE  
LA PrEP ?**



La **PrEP**  
m'empêche  
d'attraper le **VIH**,  
elle me protège

Avec la **PrEP** je  
me **protège**, je  
**prends soin de**  
**moi** et de **mes**  
**partenaires**

La **PrEP** est  
**efficace si elle**  
**est bien prise**

La **PrEP** me  
permet d'**être**  
**autonome** sur ma  
**protection VIH**



**5.**

**LA  
PRÉVENTION  
COMBINÉE**

**La PrEP protège uniquement du VIH, pas des autres infections sexuellement transmissibles.**


**Je pense aussi :**



Au **préservatif** qui me **protège de toutes les autres infections sexuellement transmissibles** (VIH, Syphilis, Hépatites, Chlamydiae, Gonocoque...)



À demander un **dépistage régulier**. C'est **gratuit** et **anonyme** dans les **centres de dépistage** (CeGIDD)



Au **Traitement d'Urgence** contre le **VIH** : Le TPE est un autre **médicament** qui permet de se **protéger contre le VIH**. Il se prend **après un risque** (problème de préservatif par exemple). Il doit être pris au **plus tard 48h heures après le rapport sexuel non protégé**.

Plus d'informations sur [masantesexuelle.fr](https://www.masantesexuelle.fr)

