



Yo me **cuido**, **cuido** de
mi familia y me **protejo**
tomando la **PrEP**



1.

**¿QUÉ ES
LA PrEP?**

UN TRATAMIENTO PREVENTIVO CONTRA EL VIH

La PrEP me protege del VIH pero no de las infecciones de transmisión sexual.

La PrEP protege únicamente a las personas que no están contaminadas por el virus del VIH.

La PrEP no impide quedarse embarazada.



2.

**¿PARA
QUIEN ES
LA PrEP?**

PARA TODAS Y TODOS

De acuerdo con nuestra situación, **todos** podemos beneficiarnos de la PrEP, después de haber consultado con un médico.

No tengo A.M.E.
(Ayuda Médica
del Estado) o
Seguro de Salud.



✓ Ningún problema

No tengo
documentación



✓ Ningún problema

No tengo
dinero



✓ Ningún problema





3.

**¿CÓMO
TOMAR
LA PrEP?**



¿DÓNDE PUEDO CONSEGUIR UNA RECETA MEDICA PARA LA PrEP?



CON MI
MÉDICO



EN EL
HOSPITAL



EN EL
CENTRO DE
DIAGNÓSTICO O
EN UN CENTRO
DE SALUD



MI PRIMERA CONSULTA MEDICA



¿CÓMO
FUNCIONA?

El **médico** me explica lo que es la **PrEP**, que es **lo que tengo que hacer** y si el tratamiento es **indicado para mi**.





Puedo buscar el tratamiento
en la **farmacia.**

SE TOMA TODOS LOS DÍAS



Muy fácil, la tomo **todos los días a la misma hora** y de preferencia con una comida.

UNA CONSULTA MEDICA A CADA 3 MESES



1 consulta con mi médico a cada
3 meses para hacer una **revisión**
médica y renovar mi PrEP.



4.

**¿PORQUÉ
TOMAR
LA PrEP?**



La PrEP me
protege y
me impide
infectarme del
virus del VIH

Con la **PrEP**,
yo me cuido,
me protejo y
protejo también
mis parejas
sexuales.

La PrEP es
eficaz si
se toma
correctamente.

La PrEP me **da**
autonomía en
mi **protección**
contra el VIH.



5.

LA PREVENCIÓN COMBINADA



La PrEP solamente protege del VIH, no de las otras infecciones de transmisión sexual.


Pienso igualmente:



El **preservativo me protege de todas las otras infecciones de transmisión sexual** (VIH, Sífilis, Hepatitis, Clamidia, Gonorrea....)



Pedir un chequeo regular. Gratuito, anónimo en los centros de diagnóstico (CeGIDD)



Existe también **otro tratamiento** (por comprimidos) **contra el VIH: el tratamiento de urgencia o PEP.** Este tratamiento se debe **tomar hasta 48 horas después de un riesgo** (ruptura del condón, por ejemplo).

Para mas información, visita masantesexuelle.fr

