



Penso a me e alla mia
famiglia e mi proteggo
con la PrEP.



1.

**COSA È
LA PrEP?**



UN TRATTAMENTO CONTRO L'HIV

La PrEP mi protegge dall'HIV ma non dalle infezioni sessualmente trasmissibili.

La PrEP protegge le persone che non sono state infettate dall'HIV.

La PrEP non impedisce di rimanere incinta.



2.

**PER CHI È
INDICATA
LA PrEP?**

PER TUTTI

Tutti possono beneficiare della PrEP, in base alla propria situazione e dopo averne parlato con il medico.

Non usufruisco dell'assistenza medica o non ho un'assicurazione



✓ Non è un problema

Non ho documenti



✓ Non è un problema

Non ho soldi



✓ Non è un problema





3.

**COME SI
ASSUME
LA PrEP?**



POSSO FARMI PRESCRIVERE LA PrEP



DAL MIO
MEDICO



ALL'OSPEDALE



IN UN CENTRO
DI SCREENING
O IN UN
CONSULTORIO



LA MIA PRIMA VISITA



MA COME
FUNZIONA?

Il **medico** mi spiega cos'è **la PrEP**, quali **esami devo fare** e se il trattamento è **adatto a me**.





Posso **prendere il**
trattamento in **farmacia.**

LA PRENDO TUTTI I GIORNI



È **semplice**, la prendo **tutti i giorni a un'ora fissa** e, se possibile, durante i pasti.

APPUNTAMENTO OGNI 3 MESI



1 appuntamento con il dottore **ogni 3 mesi** per un **controllo medico** e per **rinnovare la PrEP.**



4.

**PERCHÉ
ASSUMERE
LA PrEP?**



La **PrEP** mi
evita di
contrarre
l'**HIV**, mi
protegge

Grazie alla
PrEP mi
proteggerò, ho
cura di me
e dei miei
partner

La **PrEP** è
efficace
se assunta
correttamente

La **PrEP** mi
permette di
gestire al
meglio la
mia protezione
dall'**HIV**



5.

**PREVENZIONE
COMBINATA**



La PrEP protegge solo dall'HIV, non da altre malattie sessualmente trasmissibili.

I also remember t Ma non devo dimenticare:



Il **preservativo**, che mi protegge da tutte le altre malattie sessualmente trasmissibili (HIV, Sifilide, Epatite, Clamidia, Gonococco, etc.)



Di richiedere uno **screening regolare**. È **gratuito** e **anonimo** presso i centri di screening (CeGIDD).



Al **trattamento d'emergenza** per **l'HIV**: Il TPE è un altro **trattamento** utilizzato per **protegersi dall'HIV**. Viene assunto **dopo un incidente** (ad esempio, un problema con il preservativo). Deve essere assunto **entro 48 ore dal rapporto sessuale non protetto**.

Maggiori informazioni su masantesexuelle.fr

