



Eu me **cuido**, cuido
da minha família
e me **protejo**
tomando a **PrEP**



1.

**O QUE É
A PrEP?**

UM TRATAMENTO PREVENTIVO CONTRA O VIRUS HIV

Com a PrEP, eu me protejo do HIV mas não das outras doenças sexualmente transmissíveis.

A PrEP protege somente as pessoas que não estão contaminadas pelo vírus do HIV.

Você pode ficar grávida tomando a PrEP.



2.

**QUEM
PODE
TOMAR
A PrEP?**

TODO MUNDO

De acordo com a situação pessoal, **todo mundo** pode se beneficiar da PrEP, após ter discutido com um médico.

Não tenho A.M.E
(Ajuda Médica do
Estado) ou plano
de saúde



✓ Sem
problemas

Não tenho
documentos



✓ Sem
problemas

Não tenho
dinheiro



✓ Sem
problemas





3.

**COMO DEVO
TOMAR A
PrEP?**



ONDE POSSO CONSEGUIR UMA RECEITA PARA TOMAR A PrEP?



NO CONSULTÓRIO
DO MEU MÉDICO



NO
HOSPITAL



EM UM CENTRO
DE TESTES OU
NUM POSTO DE
SAÚDE



MINHA PRIMEIRA CONSULTA



MAS COMO É
QUE FUNCIONA?

O **médico** me diz o que é **a PrEP**, os **exames que tenho que fazer** e se este tratamento é **adequado para minha situação**.





Posso **buscar o tratamento na farmácia.**

DEVO TOMAR TODOS OS DIAS



Muito fácil:
a gente toma
todos **os dias**
sempre na
mesma hora.
De preferência,
durante uma
refeição.

UMA CONSULTA DE 3 EM 3 MESES



1 consulta com o meu médico **de 3 em 3 meses** para fazer um **exame de saúde** e **renovar a minha PrEP.**



4.

**PORQUÊ
TOMAR A
PrEP?**



A **PrEP** me
protege,
impedindo que
eu pegue o
vírus do HIV

Com a **PrEP**,
eu me cuido,
protejo a mim
e aos meus
parceiros
sexuais.

A **PrEP** é
eficaz se for
bem tomada

A **PrEP** me dá
autonomia
na minha na
minha **proteção**
contra o vírus
do HIV



5.

A PREVENÇÃO DUPLA



A PrEP protege apenas do vírus do HIV, não das outras doenças sexualmente transmissíveis.


Também penso:



No **preservativo** que me **protege de todas as outras doenças sexualmente transmissíveis** (HIV, Sífilis, Hepatites, Clamídia, Gonorréia...)



Pedir para ser testado ou testada regularmente. É **gratuito** e **anônimo** nos centros de teste (CeGIDD)



Existe também o Tratamento de Urgência contra o vírus do **HIV**: o Tratamento Pós-Exposição (TPE) é um outro protocolo, com medicamentos, que permite de **proteger-se contra o HIV**. O tratamento deve ser tomado no máximo em 48 horas **após um risco** (ruptura da camisinha, por exemplo).

Mais informations no site masantesexuelle.fr

