



Am grijă de mine
și de familia mea.
'Mă protejez cu
PrEP.



1.

**CE ESTE
PrEP?**

UN TRATAMENTUL PENTRU INFECȚIA CU HIV

**PrEP mă protejează de HIV, dar nu și de
infecțiile cu transmitere sexuală.**

**PrEP protejează persoanele care nu sunt
infectate cu HIV.**

PrEP nu împiedică apariția unei sarcini.



2.

**PENTRU
CINE ESTE
RECOMANDAT
PrEP?**

PENTRU TOATĂ LUMEA

Toată lumea poate beneficia de PrEP, în funcție de situație și după o discuție cu medicul.

Nu am asigurare de sănătate.



✓ Nicio problemă.

Nu am acte de identitate.



✓ Nicio problemă.

Nu am bani.



✓ Nicio problemă.





3.

**CUM SE
ADMINISTREAZĂ
PrEP?**



POT OBTINE O REȚETĂ PENTRU PREP




DE LA
DOCTORUL
MEU



DE LA
SPITAL



ÎNTR-UN CENTRU
DE DEPISTARE
SAU ÎNTR-UN
CABINET MEDICAL



PRIMA MEA CONSULTAȚIE



CUM SE
DESFĂȘORĂ
ACEASTA

Medicul îmi explică ce este **PrEP**, ce **examene medicale trebuie să fac** și dacă acest tratament este **potrivit pentru mine**.





Pot **să iau tratamentul** de la **farmacie.**

SE IA ÎN FIECARE ZI



Este **ușor**. Iau
medicamentul **în
fiecare zi, la
oră fixă** și în
timpul mesei, dacă
este posibil.

0 PROGRAMARE LA FIECARE 3 LUNI



1 întâlnire cu medicul **la fiecare 3 luni**
pentru un **control** și **pentru a-mi reînnoi**
tratamentul cu PrEP.



4.

**DE CE SĂ
IAU PrEP?**



PrEP mă împiedică să mă infectez cu HIV. Mă protejează.

Cu PrEP mă protejez, am grijă de mine și de partenerii mei.

PrEP este eficient dacă este luat în mod corect.

Cu PrEP pot fi independent în ceea ce privește **protecția împotriva infecției cu HIV.**



5.

**PREVENȚIA
COMBINĂTĂ**



PrEP protejează numai de HIV, nu și de alte infecții cu transmitere sexuală.


De aceea, nu uit:



Prezervativul, care mă **protejează de toate celelalte infecții cu transmitere sexuală** (HIV, sifilis, hepatită, Chlamydia, Gonococcus...)



Să solicit o **depistare periodică**. Este **gratuită** și **anonimă** în centrele de depistare (Centrele de informare, depistare și diagnosticare)



Tratamentul de urgență pentru **HIV**: TPE este un alt **medicament** care vă permite **să vă protejați împotriva infecției cu HIV**. Se ia **după o situație riscantă** (de exemplu, probleme cu prezervativul). Ar trebui să fie luat **nu mai târziu de 48 de ore după un raport sexual neprotejat**.

Mai multe informații găsiți pe masantesexuelle.fr

