




Я забочусь о себе
и своих близких:
для этого я
использую PrEP 



1.

**ЧТО
ТАКОЕ
PrEP?**



ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ВИЧ

**PrEP защищает меня от ВИЧ-инфекции,
но не от других заболеваний,
передающихся половым путем.**

**PrEP защищает тех, кто не
инфицирован ВИЧ.**

**PrEP не является средством
контрацепции.**



2.

**ДЛЯ КОГО
ПРЕДНАЗНАЧЕН
PrEP?**

|| ДЛ Я ВСЕХ

Любой может принимать PrEP по необходимости после консультации со специалистом.

У меня нет
медицинской
страховки
(А.М.Е. и т. п.)



✓ Ничего
страшного

У меня нет
документов



✓ Ничего
страшного

У меня
нет денег



✓ Ничего
страшного





КАК ПРИНИМАТЬ PrEP?



НАЗНАЧЕНИЕ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ




У
ЛЕЧАЩЕГО
ВРАЧА



В
ПОЛИКЛИНИКЕ



В СКРИНИНГ-
ЦЕНТРЕ ИЛИ
МЕДИЦИНСКОМ
ЦЕНТРЕ



МОЯ ПЕРВАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ



КАК ЭТО
РАБОТАЕТ?

Врач объяснит
мне, что такое
PrEP, какие
обследования
нужно пройти
и **подходит**
ли мне этот
препарат.





Я могу **получить препарат**
прямо в **аптеке.**

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ПРИЕМ



Это **просто**: я принимаю его **каждый день в одно и то же время**, по возможности во время еды.

КОНСУЛЬТАЦИЯ КАЖДЫЕ 3 МЕСЯЦА



**Консультация у врача раз в три месяца
для заполнения карты здоровья и
повторного назначения.**



4.

**ЗАЧЕМ
ПРИНИМАТЬ
PrEP?**



PrEP
защищает
меня
от ВИЧ-
инфекции

PrEP
обеспечивает
защиту **при**
соблюдении
правил
приема

PrEP
позволяет мне
самостоятельно
позаботиться **о**
защите от ВИЧ

Принимая **PrEP**,
я не просто
защищаю
себя: я
забочусь о
себе и своих
партнерах



5.

КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА



PrEP защищает от ВИЧ-инфекции, но не от других инфекций, передающихся половым путем.


Я также не забываю:



Использовать **презервативы**, которые **защищают меня от других инфекций, передающихся половым путем** (ВИЧ, сифилис, гепатит, хламидиоз, гонококк и т. п.).



Регулярно проходить обследование. Его можно пройти **бесплатно** и **анонимно** в любом из скрининг-центров (CeGIDD).



Об **экстренных мерах** борьбы с **ВИЧ: препарате PrEP**, также используемом для **защиты от ВИЧ**. Принимать его следует **после возникшего риска заражения** (к примеру, при проблеме с презервативом). Препарат необходимо принять **в течение 48 часов после незащищенного полового контакта**.

Более подробная информация:
masantesexuelle.fr

