



Я **дбаю** про  
себе та свою  
сім'ю за  
**ДОПОМОГОЮ**  
**PrEP**





1.

**ЩО ТАКЕ  
PrEP?**



# ЛІКУВАННЯ ВІЛ

**PrEP захищає мене від ВІЛ, але не від інфекцій, що передаються статевим шляхом.**

**PrEP захищає людей, які не інфіковані ВІЛ.**

**PrEP не заважає завагітніти.**





**2.**

**ДЛЯ КОГО  
ПРИЗНАЧАЕТСЯ  
PrEP?**



# || ДЛЯ ВСІХ

**Кожен** може скористатися PrEP залежно від своєї ситуації та після консультації з лікарем.

У мене немає страхівки а. М. Е або іншої медичної страхівки



✓ Нічого страшного

У мене немає документів



✓ Нічого страшного

У мене немає грошей



✓ Нічого страшного





# ДЕ ВЗЯТИ PrEP?



# Я МОЖУ ОТРИМАТИ PREP САМОСТІЙНО



У ЛІКАРЯ



У ЛІКАРНІ



У ЦЕНТРИ  
СКРИНІНГУ  
АБО  
МЕДИЧНОМУ  
ЦЕНТРИ



# МОЯ ПЕРША КОНСУЛЬТАЦІЯ



ЯК ЦЕ  
ПРАЦУЄ?

**Лікар** пояснить мені, що таке **PgEP**, яке **обстеження** необхідно **пройти** і чи **підходить мені** це лікування.








Я можу **забрати препарат**  
в **аптеці.**

# ПРИЙМАТИ ЙОГО ПОТРІБНО ЩОДНЯ



Все **просто**: я  
приймаю його  
**щодня в один і  
той же час** і по  
можливості під  
час їжі.

# КОНСУЛЬТАЦІЯ РАЗ НА ТРИ МІСЯЦІ




**Одна консультація у лікаря кожні три місяці для обстеження і продовження прийому PrEP.**



**4.**

**НАВІЩО  
ПРИЙМАТИ  
PrEP?**



**PrEP** запобігає  
зараженню  
**ВІЛ**, він  
захищає мене

За допомогою  
**PrEP** я захищаю  
себе, а також дбаю  
**про себе та своїх  
партнерів**

**PrEP**  
ефективний,  
якщо  
приймати його  
правильно

**PrEP**  
дозволяє мені  
**самостійно**  
подбати про  
захист від **ВІЛ**





**5.**

**КОМБІНОВАНА  
ПРОФІЛАКТИКА**



**PrEP захищає тільки від ВІЛ і не забезпечує захист від інших інфекцій, що передаються статевим шляхом.**


**Я не забуваю:**



Про **презерватив**, який захищає мене **від усіх інших інфекцій, що передаються статевим шляхом** (ВІЛ, сифіліс, гепатит, хламідіоз, гонокок та інші)



**Регулярно проходити обстеження.** Його можна **безкоштовно і анонімно** пройти в одному із центрів скринінгу (CeGIDD)



Про **екстрену терапію ВІЛ: TPE** — це ще один **препарат**, який використовується для **захисту від ВІЛ**. Його приймають **після виникнення ризику** (наприклад, при проблемах з презервативом). Приймати його слід **не пізніше ніж через 48 годин після незахищеного статевого акту.**

Більше інформації ви можете знайти на сайті  
**masantesexuelle.fr**

